



# OMEOPROFILASSI E V.A.S PROTOCOLLO DI ATTIVAZIONE IMMUNOLOGICA SPECIFICA

In ottemperanza al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 , l'Accademia di Medicina Biologica Consecutiva propone alla cittadinanza Italiana un protocollo di attivazione immunologica umorale e cellulare per migliorare a corto e lungo termine qualsiasi tipo di immunizzazione .

**Il presente protocollo e valida sia per bambini che adulti , basato su studi osservazionali da piu di 20 anni .**



PROTOCOLLO DI BASE PER:

## **Difterite, Tetano, Poliomielite, Pertosse, Haemophilus B ed Epatite B**

**Un mese prima dell'immunizzazione assumere una volta ogni 4 giorni una dose (Tubo Da 1 Grammo):**

1. DIFTERINUM 15CH DOSE
2. TETANOTOXINUM 15CH DOSE
3. POLIOMIELITIS NOSODE 15CH DOSE
4. PERTUSSINUM 15CH DOSE
5. HEPATITIS A+B VACCIN TUBO DI 1 GRAMMO
6. HAEMOPHILUS INFLUENZAE B NOSODE C15

**Assumere ogni giorno , mattina e sera due granuli di**

1. CITOMIX GUNA
2. 10 GRANULETTI DI .ALUMINIUM HYDROXYDATUM C15 (TUBO DI 30G)
3. 5 GOCCE LA MATTINA DI OTI VITD
4. 10 GOCCE LA MATTINA DI MALVIX RENACO

**La mattina prima dell'immunizzazione :**

1. CITOMIX 10 GRANULI
2. SILICEA 15CH DOSE ,
3. UNA DOSE Dipht Tet Pert IPV HIB Vacc. B C15 (TUBO DI 1GRAMMO)
4. 10 GOCCE GUNA INTERLEUKIN 12 4CH ,
5. 10 GOCCE MALVIX RENACO

**La sera dopo l'immunizzazione :**

1. CITOMIX GUNA , 10 GRANULI
2. THUYA 15CH DOSE , UNA DOSE
3. ALUMINIUM HYDROXYDATUM C15 30 GRANULI
4. GUNA INTERLEUKIN 6 4CH , 10 GOCCE
5. MALVIX RENACO , 10 GOCCE

**Per un mese dopo l'immunizzazione :**

1. CITOMIX GUNA
2. DUE GRANULI MATTINA E SERA
3. ALUMINIUM HYDRAXYDATUM C15 10 GRANULI MATTINA E SERA
4. MALVIX RENACO 10 GOCCE MATTINA E SERA
5. GUNA-INTERLEUKIN 12 4CH, 10 GOCCE MATTINA E SERA

Associazione - Association "ACADEMY OF BIOLOGICAL CONSECUTIVE MEDICINE"

Sede Sociale - Registered Office: Via San Pietro in Lama, n. 90 – Lecce (LE) – ITALY

Codice Fiscale - Taxpayer's Code: 93128680753


[www.terapiaconsecutiva.eu](http://www.terapiaconsecutiva.eu)



---

**In caso di episodio febbrile post-immunizzazione:**

1. GUNA –ANTIL1 10 GOCCE OGNI ORA
2. CITOYANG ZENZERO RENACO 10 GOCCE OGNI ORA



Medicina  
Biologica  
Consecutiva

PROTOCOLLO DI BASE PER:

## Meningite

**Una settimana prima dell'immunizzazione assumere una dose ogni quattro giorni:**

1. NEISSERIA MENINGITIDIS C15 (TUBO DI 1 GRAMMO)

**La mattina prima dell'immunizzazione :**

MENINGOCOCCINUM VACCIN C15 (TUBO DI 1G)

**Oppure**

Meningokokken-Gruppen A,C, W-135 und  
YKonjugatimpfstoff C15 (TUBO DI 1G)

**a secondo il tipo di immunizzazione scelta Inoltre:**

2. CITOMIX 10 GRANULI
3. SILICEA 15CH DOSE ,
4. 10 GOCCE GUNA INTERLEUKIN 12 4CH ,
5. 10 GOCCE MALVIX RENACO

**La sera dopo l'immunizzazione :**

1. CITOMIX GUNA , 10 GRANULI
2. THUYA 15CH DOSE , UNA DOSE
3. ALUMINIUM HYDROXYDATUM C15 30 GRANULI
4. GUNA INTERLEUKIN 6 4CH , 10 GOCCE
5. MALVIX RENACO , 10 GOCCE

**Per un mese dopo l'immunizzazione :**

1. CITOMIX GUNA
2. DUE GRANULI MATTINA E SERA
3. ALUMINIUM HYDRAXYDATUM C15 10 GRANULI MATTINA E SERA
4. MALVIX RENACO 10 GOCCE MATTINA E SERA
5. GUNA-INTERLEUKIN 12 4CH, 10 GOCCE MATTINA E SERA

**In caso di episodio febbrile post-immunizzazione:**

1. GUNA -ANTIIL1 10 GOCCE OGNI ORA
2. CITOYANG ZENZERO RENACO 10 GOCCE OGNI ORA

Associazione - Association "ACADEMY OF BIOLOGICAL CONSECUTIVE MEDICINE"

Sede Sociale - Registered Office: Via San Pietro in Lama, n. 90 – Lecce (LE) – ITALY

Codice Fiscale - Taxpayer's Code: 93128680753

[www.terapiaconsecutiva.eu](http://www.terapiaconsecutiva.eu)



PROTOCOLLO DI BASE PER:

## **Morbillo, Rosolia, Parotite e Varicella**

**Venti giorni prima dell'immunizzazione assumere una dose ogni quattro giorni:**

1. MORBILLINUM 15CH DOSE
2. RUBEOLINUM C15 (TUBO 1 G)
3. PAROTITIS NOSODE C15 (TUBO 1G)
4. VARICELLA NOSODE C15 (TUBO 1G)

**La mattina prima dell'immunizzazione :**

1. Measels-Mumps-Rubella-Chickenpox vaccine C15 (TUBO DI 1 GRAMMO)
2. CITOMIX 10 GRANULI
3. SILICEA 15CH DOSE ,
4. 10 GOCCE GUNA INTERLEUKIN 12 4CH ,
5. 10 GOCCE MALVIX RENACO

**In caso di episodio febrile post-immunizzazione:**

1. GUNA –ANTIIL1 10 GOCCE OGNI ORA
2. CITOYANG ZENZERO RENACO 10 GOCCE OGNI ORA

**Per un mese dopo l'immunizzazione :**

1. CITOMIX GUNA
2. DUE GRANULI MATTINA E SERA
3. ALUMINIUM HYDRAXYDATUM C15 10 GRANULI MATTINA E SERA
4. MALVIX RENACO 10 GOCCE MATTINA E SERA
5. GUNA-INTERLEUKIN 12 4CH, 10 GOCCE MATTINA E SERA

### **Bibliografia**

.Vaccini E Vaccinazioni Terza Edizione 2012 Giorgio Bartolozzi Elsevier Srl  
.Manuale Di Omeoprolassi Isaac Golden 2012 Salus Infirmorum Sas Edizioni  
.Vaccines And Autoimmunity Yehuda Shoenfeld,Nancy Agmon-Levin, Lucija Tomljenovic Ed Wiley Blackwell Maggio 2015

**I prodotti OMEOPATICI descritti sono tutti reperibili nel sito [www.remedia.at](http://www.remedia.at)**